Forme et présentation

Flacon de 120 ml + œillère

Composition

Solution isotonique, stérile
contenant de l'acide borique, du borate de sodium du chlorure de sodium et de l'eau purifiée ; agents conservateurs : édétate disodique à 0,025 % et acide sorbique à 0,1 %.

Indication

Solution pour lavage oculaire

Posologie et mode d'administration

VOIE OPHTALMIQUE
Ôter les lentilles de contact préalablement à l'emploi de la solution.

Si l'œillère est utilisée : rincer l'œillère à l'aide de OPHTAXIA® Flacon juste avant et après chaque utilisation.
Eviter toute contamination du bord et de la partie intérieure de l'œillère.
Remplir à demi l'œillère avec OPHTAXIA® Flacon.
Pencher la tête en avant, tenir l'œillère par la base et l'appliquer sur l'œil en exerçant une légère pression afin d'éviter toute fuite de produit.
Relever lentement la tête et la renverser en arrière.
Si l'œillère n'est pas utilisée : le lavage se fera par instillation délicate de la solution sur la surface de l'œil après avoir exercé une légère pression sur le flacon.

Mode d'emploi:

Si l'œillère est utilisée :

Rincer l'œillère à l'aide de OPHTAXIA® Flacon juste avant et après chaque utilisation.
Eviter toute contamination du bord et de la partie intérieure de l'œillère.
Remplir à demi l'œillère avec OPHTAXIA® Flacon.
Pencher la tête en avant, tenir l'œillère par la base et l'appliquer sur l'œil en exerçant une légère pression afin d'éviter toute fuite de produit.
Relever lentement la tête et la renverser en arrière.
Ouvrir les paupières largement et faire tourner l'oeil de manière à permettre un lavage complet.
Eliminer toute solution restant dans l'œillère.
Pour laver l'autre œil, reprendre les étapes ci-dessus, y compris le rinçage de l'œillère, en utilisant de la solution fraîchement sortie du flacon.

Si l'œillère n'est pas utilisée :

Le lavage se fera par instillation délicate de la solution sur la surface de l'œil après avoir exercé une légère pression sur le flacon.

L'œillère est stérile si l'emballage n'est pas endommagé.

Mises en garde et précautions d'emploi

Oter les lentilles de contact préalablement à l'emploi de la solution.
Pour prévenir toute contamination, éviter tout contact avec l'extrémité du récipient.
Remettre le capuchon après usage.
Ne pas utiliser la solution si celle-ci a changé de couleur ou est trouble.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption figurant sur l'emballage extérieur et sur le flacon.
Eliminer toute solution non utilisée 3 mois après ouverture du flacon.
Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité est rompue ou manquante.

IMPORTANT :

En cas de survenue, de persistance ou d'aggravation d'une irritation ou d'un larmoiement excessif, ou de troubles de la vue, arrêter l'emploi du collyre et consulter rapidement un ophtalmologiste

Avantages

Conservation après ouverture : 3 mois.
S'utilise à tous les âges
Usage traditionnel, avec une œillère

CODE ACL : 777696-2

Ophtaxia Flacon est un dispositif médical de classe IIb, produit de santé réglementé qui porte le marquage CE établi par l'organisme habilité NSAI 0050. Fabricant : Bausch & Lomb Incorporated.
Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice.